

三民書局

112學年度學科能力測驗模擬試題(一)

數學B考科

教師用

測驗範圍：高中數學一、二年級數學 B

—作答注意事項—

考試時間：100 分鐘

作答方式：將答案填入卷末之答案欄中。

※此份試題本為模擬學科能力測驗之測驗形式，作答方式仍以實際學測之測驗形式為準。

選擇（填）題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。
- 選填題每題有 n 個空格，須全部答對才給分，答錯不倒扣。

版權所有
請勿翻印

第壹部分、選擇(填)題(占 85 分)

一、單選題(占 35 分)

說明：第 1 題至第 7 題，每題 5 分。

1. 計算化簡 $\sqrt{\frac{243^4 + 9^8}{3^8 + 27^4}}$ 等於？

- (1) $3\sqrt{3}$ (2) 9 (3) 27 (4) 81 (5) 243

答案：(4)

解析：原式 = $\sqrt{\frac{3^{20} + 3^{16}}{3^8 + 3^{12}}} = \sqrt{\frac{3^{16}(3^4 + 1)}{3^8(1 + 3^4)}} = 3^4 = 81$ ，選(4)

2. 坐標平面上五個點(1,3)、(1,4)、(3,1)、(6,5)、(4,2)，求一直線 L 滿足此五點與 L 的水平距離差的平方和最小，則 L 方程式為？

- (1) $y - 5x + 12 = 0$ (2) $x - 5y + 12 = 0$ (3) $x = y + 1$
(4) $3x - 10y + 21 = 0$ (5) $3y - 10x + 21 = 0$

答案：(5)

解析：所求為 x 對 y 的迴歸直線。由資料(3,1)、(4,1)、(1,3)、(5,6)、(2,4)算得 y 對 x 的

迴歸直線為 $y - 3 = \frac{3}{10}(x - 3)$ ，化簡得 $3x - 10y + 21 = 0$ ，故所求為 $3y - 10x + 21 = 0$

故選(5)

3. 將 5 本相同的書任意分給 3 個人，共有幾種分法？

- (1) 21 (2) 125 (3) 243 (4) 35 (5) 5

答案：(1)

解析：所求 = $C_5^{5+3-1} = 21$ ，故選(1)

4. 已知平面上一定直線 $L: y = mx$ ($m > \frac{4}{3}$) 及一點 $P(3, 4)$ ，則一個圓 C 滿足圓心在 x 軸上，且圓 C 通過 P 點且與 L 相切，問這樣的圓 C 可能的個數為
- (1)0 (2)1 (3)2 (4)4 (5)不一定

答案：(3)

解析：令圓心 $C(x, 0)$ ，則 $\sqrt{(x-3)^2 + 16} = \frac{|mx|}{\sqrt{m^2 + 1}} \Rightarrow x^2 - 6(m^2 + 1)x + 25(m^2 + 1) = 0$

其判別式 $= 36(m^2 + 1)^2 - 100(m^2 + 1) = 4(9m^2 - 16)(m^2 + 1) > 0$

可知 x 有兩相異實根，故選(3)

5. 已知一公比為 r 的等比數列，其前 n 項和為 S_n ， n 為任意正整數，若 $\langle S_n \rangle$ 是等差數列，試求 r 之值。

- (1) $\frac{1}{2}$ (2)1 (3) $-\frac{1}{2}$ (4)-1 (5)0

答案：(2)

解析： $\because S_n, S_{n+1}, S_{n+2}$ 成等差：

①若 $r = 1$ ，則 $S_n = na$ 、 $S_{2n} = (n+1)a$ 、 $S_{3n} = (n+2)a$ 為等差，成立 (a 為首項 $\neq 0$)

②若 $r \neq 1$ ， $2S_{n+1} = S_n + S_{n+2} \Rightarrow \frac{2a(1-r^{n+1})}{1-r} = \frac{a(1-r^n)}{1-r} + \frac{a(1-r^{n+2})}{1-r} \Rightarrow r^n(r-1)^2 = 0$

$\because r \neq 0$ ， $\therefore r-1=0$ ，但 $r \neq 1$ ，故 r 無解

由①②得 $r = 1$ ，故選(2)

6. 有三組資料各 6 筆如下，令 σ_A 、 σ_B 、 σ_C 分別表 A 、 B 、 C 三組資料之標準差，則下列何者正確？

$A: 21, 31, 51, 81, 61, 41$

$B: 40, 60, 50, 90, 80, 70$

$C: 54, 81, 36, 63, 72, 45$

- (1) $\sigma_A = \sigma_B = \sigma_C$ (2) $\sigma_A > \sigma_B = \sigma_C$ (3) $\sigma_A > \sigma_B > \sigma_C$
(4) $\sigma_A = \sigma_B > \sigma_C$ (5) $\sigma_B > \sigma_A > \sigma_C$

答案：(3)

解析： C 資料為 B 資料的 0.9 倍

又 B 資料的標準差 = 資料 $\{21, 31, 41, 51, 61, 71\}$ 的標準差 $< A$ 資料的標準差，故選(3)

7. 設 $f(x) = x^3 + 7x^2 + 7x + 16$ ，試求 $f(17) \div 23$ 的餘數。

- (1) -6 (2) 6 (3) 10 (4) 16 (5) 22

答案：(3)

解析： $\because f(x) = (x+6)(x^2+x+1)+10$ ， $\therefore f(17) = 23 \times (17^2+17+1)+10$

可知 $f(17) \div 23$ 的餘數為 10，故選(3)

二、多選題(占 30 分)

說明：第 8 題至第 13 題，每題 5 分。

8. 已知圓內接四邊形 $ABCD$ ， $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{BC} = 1$ ， $\overline{AD} = 4$ ， $\angle BAD = 120^\circ$ ， $\overline{CD} = x$ ，試選出正確的選項。

- (1) x 的解不只 1 個 (2) $9 < x < 11$ (3) $8 < x < 10$ (4) $7 < x < 9$ (5) x 為有理數

答案：(2)(3)

解析： $\angle C = 60^\circ$ ，由餘弦定理 $\overline{BD}^2 = 6^2 + 4^2 - 2 \times 6 \times 4 \cos A = 1^2 + x^2 - 2x \cos C$

解得 $x = \frac{1 \pm \sqrt{301}}{2}$ (負不合)， $\frac{1 + \sqrt{301}}{2} = 9. \dots$ ，故選(2)(3)

9. 從 1 到 9 這 9 個數中任取相異兩個數，令 m 表示其和為偶數的機率， p 表示其乘積為偶數的機率，試選出正確的選項。

- (1) $m > \frac{1}{2}$ (2) $m = \frac{1}{2}$ (3) $p > \frac{1}{2}$ (4) $p > m$ (5) $p + m > 1$

答案：(3)(4)(5)

解析：取出之相異兩個數的方法數有 $C_2^9 = 36$ 種
兩數和為偶數，則兩數同為奇數或偶數

$$m = \frac{C_2^5 + C_2^4}{36} = \frac{10 + 6}{36} = \frac{4}{9}$$

兩數乘積為偶數，至少一數為偶數

$$p = 1 - \frac{C_2^5}{36} = \frac{13}{18}$$

故選(3)(4)(5)

10. 設 M 、 N 皆為 2 階方陣， A 為 2×3 階矩陣， B 為 3×2 階矩陣， I_2 為 2 階單位矩陣， I_3 為 3 階單位矩陣，試選出正確的選項。

- (1) 若 $MN = I_2$ ，則 $NM = I_2$
- (2) 若 $AB = I_2$ ，則 $BA = I_3$
- (3) 若 A 不為零矩陣， $MA = A$ ，則 $BM = B$
- (4) 若 $MN = NM$ ，則 $M^{-1}N = NM^{-1}$
- (5) 若 $MN = N$ 且 M^{-1} 存在，則 $MA = A$

答案：(1)

解析：(1) ○： $N = M^{-1}$

(2) ×：如 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$ ，但 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \neq I_3$

(3) ×：如 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，但 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

(4) ×： M 可能為零矩陣

(5) ×： N 可能為零矩陣

故選(1)

11. 擲三顆相同的骰子 1 次，試選出正確的選項。

- (1) 恰有一顆骰子是 6 點的機率為 $\frac{25}{72}$
- (2) 恰有兩顆骰子是 6 點的機率為 $\frac{5}{72}$
- (3) 恰有一顆骰子是 6 點，一顆骰子是 1 點的機率為 $\frac{1}{9}$
- (4) 三顆骰子的點數和為 10 的機率最大
- (5) 三顆骰子的點數均不相同的機率為 $\frac{5}{9}$

答案：(1)(2)(3)(4)(5)

解析：(1) ○： $P(\text{恰有一顆骰子是 6 點}) = C_1^3 \times \frac{1}{6} \times \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{72}$

(2) ○： $P(\text{恰有兩顆骰子是 6 點}) = C_2^3 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times \frac{5}{6} = \frac{5}{72}$

(3) ○： $P(\text{恰有一顆骰子是 6 點，一顆骰子是 1 點}) = C_1^3 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times 2 \times \frac{4}{6} = \frac{1}{9}$

(4) ○： 三顆骰子的點數和為 10 或 11 的機率最大

(5) ○： $P(\text{三顆骰子的點數均不相同}) = 1 \times \frac{5}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{5}{9}$

故選(1)(2)(3)(4)(5)

12. 直角坐標上四點 $A(0,0)$ 、 $B(2,3)$ 、 $C(-7,s)$ 、 $D(t,-6)$ ，若 \overline{AD} 垂直 \overline{AB} 且直線 AD 交 \overline{BC} 於 P ， $\triangle ABP$ 與 $\triangle ACP$ 面積比為 $2:1$ ，試選出正確的選項。

- (1) $t=9$ (2) C 點在第三象限 (3) $(\overline{AB}+2\overline{AC})\parallel\overline{AD}$
(4) $\triangle ABC$ 面積 >13 (5) \overline{BD} 在 \overline{BA} 的正射影為 $(-2,-3)$

答案：(1)(3)(5)

解析：(1) \circ ： $\overline{AB}\cdot\overline{AD}=(2,3)\cdot(t,-6)=0$ 得 $t=9$

(2) \times ： $\overline{BP}:\overline{CP}=2:1$ ，由內分點公式知 $P(-4,\frac{2s+3}{3})$

又 P 在直線 AD 上，得 $s=\frac{5}{2}$ ，故 C 點在第二象限

(3) \circ ： $\overline{AP}=\frac{2}{3}\overline{AC}+\frac{1}{3}\overline{AB}$ 且 $\overline{AP}\parallel\overline{AD}$ ，故 $(\overline{AB}+2\overline{AC})=3\overline{AP}\parallel\overline{AD}$

(4) \times ： $\overline{BC}:x-18y+52=0$ ，則 $d(A,\overline{BC})=\frac{4\sqrt{13}}{5}$

$\triangle ABC$ 面積 $=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times d(A,\overline{BC})=13$

(5) \circ ： \overline{BD} 在 \overline{BA} 的正射影 $=\overline{BA}=(-2,-3)$

故選(1)(3)(5)

13. 令 $S=1^2+(1^2+2^2)+(1^2+2^2+3^2)+\cdots+(1^2+2^2+3^2+\cdots+21^2)$ ，試選出正確的選項。

- (1) $S > 20000$ (2) S 是 7 的倍數 (3) S 是 77 的倍數
(4) S 是 43 的倍數 (5) S 是 253 的倍數

答案：(2)(3)(5)

解析： $S=1^2\times 21+2^2\times 20+\cdots+21^2\times 1=1^2\times(22-1)+2^2\times(22-2)+\cdots+21^2\times(22-21)$

$$=22(1^2+2^2+\cdots+21^2)-(1^3+2^3+\cdots+21^3)$$

$$=22\times\frac{21\times 22\times 43}{6}-\left(\frac{21\times 22}{2}\right)^2$$

$$=7\times 11^2\times 23=19481$$

故選(2)(3)(5)

三、選填題（占 20 分）

說明：第 14 至 17 題，每題 5 分。

14. 已知某國家有 15% 的人受到新型冠狀病毒病（COVID-19）感染，目前此國有 1 種檢測法可以檢測一個人是否受到 COVID-19 病毒感染。假若被檢驗者已受到 COVID-19 病毒感染，則使用此檢測法有 90% 可以檢測出；而若被檢驗者未受到 COVID-19 病毒感染，則使用此檢測法有 6% 會誤判受到感染。今有小胖因擔心受到 COVID-19 病毒感染，使用檢測法得到報告遭受 COVID-19 病毒感染，則小胖確實遭受 COVID-19 病毒感染的機率為_____。（需化為最簡分數）

答案： $\frac{45}{62}$

解析： $P(\text{小胖確實遭受 COVID-19 病毒感染}) = \frac{0.15 \times 0.9}{0.15 \times 0.9 + 0.85 \times 0.06}$
 $= \frac{15 \times 90}{15 \times 90 + 85 \times 6} = \frac{45}{62}$

15. 阿三有一個 $\triangle ABC$ 的田地，其中 $\overline{AB} = 12$ 、 $\overline{BC} = 16$ 、 $\angle B = 60^\circ$ ，今阿三欲在田地的內部規劃一個長方形 $DEFG$ 種植草莓。已知此長方形的一邊在 \overline{AB} 上，則此長方形 $DEFG$ 的最大面積為_____。

答案： $24\sqrt{3}$

解析：如圖，令長方形之 $\overline{DG} = x$ ， $\overline{FG} = y$


$\triangle ABC$ 之高 $\overline{CH} = 16 \sin 60^\circ = 8\sqrt{3}$

由相似比例， $\frac{8\sqrt{3}}{12} = \frac{8\sqrt{3} - x}{y}$ 得 $12x + 8\sqrt{3}y = 96\sqrt{3}$

長方形面積 = xy

由算幾不等式得 $\frac{12x + 8\sqrt{3}y}{2} \geq \sqrt{96\sqrt{3}xy}$ ，得 $xy \leq 24\sqrt{3}$

故長方形 $DEFG$ 的最大面積為 $24\sqrt{3}$



16. 三次函數 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x + 3$ 的對稱中心坐標為_____。

答案： $(2, 3)$

解析：對稱中心坐標為 $(-\frac{-6}{3}, f(-\frac{-6}{3})) = (2, 3)$

17. 滿足 $\sqrt{t+1} - \sqrt{t} > 0.02$ 的最大正整數 t 值為_____。

答案： 624

解析： $\sqrt{t+1} - \sqrt{t} = \frac{(\sqrt{t+1} - \sqrt{t})(\sqrt{t+1} + \sqrt{t})}{\sqrt{t+1} + \sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{t+1} + \sqrt{t}} > 0.02 = \frac{1}{50} \Rightarrow \sqrt{t+1} + \sqrt{t} < 50$

$\therefore \sqrt{624+1} + \sqrt{624} < 50$ 且 $\sqrt{625+1} + \sqrt{625} > 50$ ，故 t 的最大正整數值為 624

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

第 18 至 19 題為題組

金先生一家人準備在放假期間規劃旅遊活動，首先他們選了 7 個想去的地點，其中包含甲城市和乙城市，然後準備從中挑選 5 個地點去遊玩，但必須要包含甲城市和乙城市，而且這 5 個地點的遊玩先後次序一定要先去甲城市再去乙城市（但甲城市和乙城市的遊玩次序並不一定要相鄰）。試回答下列問題：

18. 若總共有 T 種不同的可能旅遊路線，試選出正確的選項。（多選題，5 分）

(1) T 為三位數 (2) $T = 480$ (3) $4!$ 能整除 T (4) $5!$ 能整除 T (5) T 能被 200 整除

答案：(1)(3)(4)(5)

解析： $T = C_3^5 \times \frac{5!}{2!} = 600 = 5 \times 5!$ ，故選(1)(3)(4)(5)

19. 若這 7 個地點也包含丙城市及丁城市，且丙城市及丁城市至多只能選一個去，試問總共有幾種可能的旅遊路線？（非選擇題，10 分）

答案：可能的旅遊路線數 = $600 - (\text{丙城市及丁城市兩個都選的方法數})$

$$= 600 - C_1^3 \times \frac{5!}{2!} = 420 \text{ (種)}$$

112 學年度學科能力測驗模擬試題(一) 數學 B 考科

答案卷

第壹部分：選擇題（占 85 分）

一、 單選題（占 35 分）

1	4	2	5	3	1	4	3	5	52	6	3	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---

二、 多選題（占 30 分）

8	23	9	345	10	1	11	12345	12	135	13	235
---	----	---	-----	----	---	----	-------	----	-----	----	-----

三、 選填題（占 20 分）

14	$\frac{45}{62}$	15	$24\sqrt{3}$	16	(2,3)	17	624
----	-----------------	----	--------------	----	-------	----	-----

第貳部分：混合題（占 15 分）

作 答 區	
題號	注意：1.應依據題號順序，於作答區內作答。2.除另有規定外，書寫時應由左至右橫式書寫。3.作答須清晰，如難以辨識時，恐將影響成績評閱並傷及權益。4.不得於作答區書寫姓名、應試號碼或無關之文字、圖案符號等。
18	(1)(3)(4)(5)
19	<p>可能的旅遊路線數 = $600 - (\text{丙城市及丁城市兩個都選的方法數})$</p> $= 600 - C_1^3 \times \frac{5!}{2!} = 420 \text{ (種)}$